

## Oceňovací tabulka pro trvalé tělesné poškození

| Úrazy hlavy a smyslových orgánů   | Procento tělesného poškození |  |        |
|---|------------------------------|--|--------|
| 1. Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup> .....   | 5 %                          | 58. Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let .....   | 40 %   |
| 2. Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup> .....  | 15 %                         | 59. Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let .....   | 20 %   |
| 3. Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup> .....   | 25 %                         | 60. Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let.....   | 10 %   |
| 4. Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně.....  | 80 %                         | 61. Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů .....   | 50 %   |
| 5. Traumatická porucha lícního nervu .....  | 10 %                         | <b>Úrazy páteře a míchy</b>  |        |
| 6. Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (nelze současně oceňovat podle bodu 7).....                                       | 10 %                         | 62. Omezení hybnosti páteře lehkého stupně.....  | 10 %   |
| 7. Deformace nosu s funkční poruchou průchodnosti .....   | 10 %                         | 63. Omezení hybnosti páteře středního stupně .....   | 25 %   |
| 8. Ztráta celého nosu.....  | 20 %                         | 64. Omezení hybnosti páteře těžkého stupně.....  | 55 %   |
| 9. Ztráta čichu .....   | 10 %                         | 65. Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně .....  | 25 %   |
| 10. Ztráta chuti .....  | 5 %                          | 66. Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně.....   | 40 %   |
| 11. Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) jednoho oka - hodnocení dle pomocné tabulky.....                                       |                              | 67. Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně .....  | 80 %   |
| 12. Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) obou očí - hodnocení dle pomocné tabulky.....  |                              | <b>Úrazy pánve</b>   |        |
| 13. Za anatomickou ztrátu oka se ke ztrátě zraku připočítává .....  | 5 %                          | 68. Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin .....  | 55 %   |
| 14. Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole .....   | 20 %                         | <b>Úrazy horních končetin</b>  |        |
| 15. Ztráta čočky na jednom oku včetně poruchy akomodace do 25 let .....   | 15 %                         | Hodnocením vpravo se rozumí postižení dominantní horní končetiny, vlevo nedominantní horní končetiny.  |        |
| 16. Ztráta čočky na jednom oku včetně poruchy akomodace do 35 let .....   | 10 %                         | 69. Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo.....   | 70 %   |
| 17. Ztráta čočky na jednom oku včetně poruchy akomodace nad 35 let .....  | 5 %                          | 70. Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo .....   | 60 %   |
| 18. Traumatická porucha okoohybných nervů nebo porucha rovnováhy okoohybných svalů.....   | 25 %                         | 71. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo .....  | 35 %   |
| 19. Porušení průchodnosti slzných cest .....  | 5 %                          | 72. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo.....  | 30 %   |
| 20. Ptóza horního víčka operativně nekorigovatelná.....   | 15 %                         | 73. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st, vnitřní rotace 20 st.) vpravo .....                                     | 30 %   |
| 21. Ztráta jednoho boltce .....   | 10 %                         | 74. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st, vnitřní rotace 20 st.) vlevo.....                                       | 25 %   |
| 22. Ztráta obou boltců.....   | 15 %                         | 75. Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo.....  | 5 %    |
| 23. Nahluchlost jednostranná lehkého stupně.....  | 0 %                          | 76. Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo .....  | 4 %    |
| 24. Nahluchlost jednostranná středního stupně .....   | 5 %                          | 77. Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo .....  | 10 %   |
| 25. Nahluchlost jednostranná těžkého stupně .....   | 12 %                         | 78. Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo.....  | 8 %    |
| 26. Nahluchlost oboustranná lehkého stupně.....   | 10 %                         | 79. Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo.....  | 18 %   |
| 27. Nahluchlost oboustranná středního stupně .....  | 20 %                         | 80. Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo .....  | 15 %   |
| 28. Nahluchlost oboustranná těžkého stupně .....  | 35 %                         | 81. Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více než 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena).....  | 15 %   |
| 29. Ztráta sluchu jednoho ucha .....  | 15 %                         | 82. Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více než 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena).....   | 12,5 % |
| 30. Ztráta sluchu obou uší.....   | 45 %                         | 83. Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III) .....   | 5 %    |
| 31. Porucha labyrintu jednostranná podle stupně.....  | 10 %                         | 84. Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III) .....  | 4 %    |
| 32. Porucha labyrintu oboustranná podle stupně .....  | 30 %                         | 85. Pakloub kosti pažní vpravo .....   | 30 %   |
| 33. Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 39) ..... | 15 %                         | 86. Pakloub kosti pažní vlevo .....  | 25 %   |
| 34. Zohyzdující jizvy v obličejové části hlavy.....   | do 5 %                       | 87. Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo.....                            | 30 %   |
|   |                              | 88. Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo .....                            | 25 %   |
|   |                              | 89. Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vpravo .....   | 5 %    |
|   |                              | 90. Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vlevo .....  | 4 %    |
|   |                              | 91. Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlahvého svalu vpravo .....   | 3 %    |
|   |                              | 92. Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlahvého svalu vlevo.....   | 2,5 %  |
| <b>Poškození chrupu (způsobené úrazem)</b>  |                              | <b>Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí</b>  |        |
| 35. Ztráta jednoho zubu.....  | 1 %                          | 93. Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo .....                                 | 30 %   |
| 36. Ztráta každého dalšího zubu.....  | 1 %                          | 94. Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo .....                                  | 25 %   |
| 37. Za ztrátu, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad .....  | 0 %                          | 95. Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo .....  | 20 %   |
|   |                              | 96. Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo .....   | 16 %   |
|   |                              | 97. Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo .....   | 18 %   |
|   |                              | 98. Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo .....  | 15 %   |
|   |                              | 99. Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo ..... | 20 %   |
|   |                              | 100. Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo ..... | 16 %   |
| <b>Úrazy krku</b>   |                              |  |        |
| 38. Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně.....   | 15 %                         |  |        |
| 39. Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu .....  | 60 %                         |  |        |
| 40. Ztráta hlasu (afonie).....  | 25 %                         |  |        |
| 41. Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy.....   | 25 %                         |  |        |
| 42. Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 38 až 40).....                                | 50 %                         |  |        |
| <b>Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu</b>   |                              |  |        |
| 43. Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní, klinicky ověřené (spirometrické vyš.), lehkého stupně.....                | 10 %                         |  |        |
| 44. Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní, klinicky ověřené (spirometrické vyš.), středního a těžkého stupně.....    | 30 %                         |  |        |
| 45. Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně .....  | 40 %                         |  |        |
| 46. Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.).....   | 80 %                         |  |        |
| 47. Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG).....                        | 80 %                         |  |        |
| 48. Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně .....   | 10 %                         |  |        |
| 49. Poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně.....   | 50 %                         |  |        |
| <b>Úrazy břicha a trávicích orgánů</b>  |                              |  |        |
| 50. Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy .....   | 80 %                         |  |        |
| 51. Ztráta sleziny .....  | 15 %                         |  |        |
| 52. Zúžení konečníku podle rozsahu .....  | 40 %                         |  |        |
| <b>Úrazy močových a pohlavních orgánů</b>   |                              |  |        |
| 53. Ztráta jedné ledviny .....  | 20 %                         |  |        |
| 54. Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození).....                         | 50 %                         |  |        |
| 55. Ztráta jednoho varlete .....  | 10 %                         |  |        |
| 56. Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií) .....   | 35 %                         |  |        |
| 57. Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 do 60 let (ověřeno phaloplethysmografií).....  | 20 %                         |  |        |

|  |        |
|--|--------|
| 101. Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo.....  | 20 %   |
| 102. Omezení přivracení a odvrácení předloktí vlevo .....  | 16 %   |
| 103. Pakloub obou kostí předloktí vpravo .....   | 40 %   |
| 104. Pakloub obou kostí předloktí vlevo.....   | 30 %   |
| 105. Pakloub kosti vřetenní vpravo.....  | 30 %   |
| 106. Pakloub kosti vřetenní vlevo.....   | 25 %   |
| 107. Pakloub kosti loketní vpravo .....  | 20 %   |
| 108. Pakloub kosti loketní vlevo .....   | 15 %   |
| 109. Víklavý loketní kloub vpravo .....  | 15 %   |
| 110. Víklavý loketní kloub vlevo.....  | 10 %   |
| 111. Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo.....   | 50 %   |
| 112. Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo .....   | 45 %   |
| 113. Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo<br>(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích<br>nutných k léčení následků úrazu)..... | 27,5 % |
| 114. Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo<br>(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích<br>nutných k léčení následků úrazu).....  | 22,5 % |

#### Ztráta nebo poškození ruky

|   |        |
|---|--------|
| 115. Ztráta ruky v zápěstí vpravo .....   | 50 %   |
| 116. Ztráta ruky v zápěstí vlevo.....   | 45 %   |
| 117. Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo.....                                 | 50 %   |
| 118. Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo .....                                 | 42 %   |
| 119. Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo.....                                       | 45 %   |
| 120. Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo .....                                       | 37,5 % |
| 121. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení<br>(postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo .....   | 30 %   |
| 122. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení<br>(postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo.....     | 25 %   |
| 123. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení<br>(postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo .....   | 15 %   |
| 124. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení<br>(postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo .....    | 12,5 % |
| 125. Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení<br>(postavení 20–40 stupňů hřbetního ohnutí) vpravo ..... | 20 %   |
| 126. Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení<br>(postavení 20–40 stupňů hřbetního ohnutí) vlevo.....   | 17 %   |
| 127. Pakloub člunkové kosti vpravo.....   | 15 %   |
| 128. Pakloub člunkové kosti vlevo .....   | 12,5 % |
| 129. Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo.....   | 20 %   |
| 130. Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo.....  | 17 %   |
| 131. Víklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.).....  | 15 %   |
| 132. Víklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.).....   | 10 %   |

#### Poškození palce

|  |       |
|--|-------|
| 133. Ztráta koncového článku palce vpravo.....   | 9 %   |
| 134. Ztráta koncového článku palce vlevo .....   | 7 %   |
| 135. Ztráta palce se záprstní kostí vpravo.....  | 25 %  |
| 136. Ztráta palce se záprstní kostí vlevo .....  | 21 %  |
| 137. Ztráta obou článků palce vpravo .....   | 20 %  |
| 138. Ztráta obou článků palce vlevo .....  | 18 %  |
| 139. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce<br>v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo .....        | 8 %   |
| 140. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce<br>v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo .....         | 7 %   |
| 141. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce<br>v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo.....        | 7 %   |
| 142. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce<br>v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo .....        | 6 %   |
| 143. Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo .....   | 6 %   |
| 144. Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo .....  | 5 %   |
| 145. Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce<br>podle stupně vpravo .....                            | 9 %   |
| 146. Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce<br>podle stupně vlevo .....                             | 7,5 % |
| 147. Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo.....                                     | 25 %  |
| 148. Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo.....                                      | 21 %  |
| 149. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti<br>základního a mezičlunkového kloubu vpravo ..... | 6 %   |
| 150. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti<br>základního a mezičlunkového kloubu vlevo .....  | 5 %   |
| 151. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti<br>karpometakarpálního kloubu vpravo .....         | 9 %   |
| 152. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti<br>karpometakarpálního kloubu vlevo .....          | 7,5 % |

#### Poškození ukazováku

|   |        |
|---|--------|
| 153. Ztráta koncového článku ukazováku vpravo.....  | 5 %    |
| 154. Ztráta koncového článku ukazováku vlevo.....   | 4 %    |
| 155. Ztráta dvou článků ukazováku vpravo.....   | 8 %    |
| 156. Ztráta dvou článků ukazováku vlevo.....  | 6,5 %  |
| 157. Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo.....  | 12 %   |
| 158. Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo .....  | 10 %   |
| 159. Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo.....   | 15 %   |
| 160. Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo .....   | 12,5 % |
| 161. Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení<br>nebo ohnutí vpravo .....                               | 15 %   |
| 162. Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení<br>nebo ohnutí vlevo.....                                 | 12,5 % |
| 163. Nemožnost úplného natažení některého z mezičlunkových kloubů<br>ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci ..... | 1,5 %  |
| 164. Nemožnost úplného natažení některého z mezičlunkových kloubů<br>ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci .....  | 1 %    |
| 165. Porucha úchopové funkce ukazováku (omezení flexe do dlaně) vpravo.....   | 15 %   |
| 166. Porucha úchopové funkce ukazováku (omezení flexe do dlaně) vlevo .....   | 12,5 % |
| 167. Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku<br>s poruchou abdukce vpravo.....                               | 2,5 %  |
| 168. Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku<br>s poruchou abdukce vlevo.....                                | 2 %    |

#### Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

|  |       |
|--|-------|
| 169. Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo .....  | 9 %   |
| 170. Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo.....  | 7 %   |
| 171. Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí<br>základního kloubu vpravo.....                                  | 8 %   |
| 172. Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí<br>základního kloubu vlevo .....                                  | 6 %   |
| 173. Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí<br>základního kloubu vpravo.....  | 5 %   |
| 174. Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí<br>základního kloubu vlevo .....  | 4 %   |
| 175. Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo .....   | 2,5 % |
| 176. Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo.....   | 2 %   |
| 177. Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů<br>při neporušené úchopové funkci vpravo.....                    | 9 %   |
| 178. Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů<br>v krajním natažení nebo ohnutí vlevo.....                     | 7 %   |
| 179. Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo.....  | 8 %   |
| 180. Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo.....   | 6 %   |
| 181. Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlunkových kloubů<br>při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo ..... | 1 %   |
| 182. Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu<br>s poruchou abdukce vpravo .....                                   | 1,5 % |
| 183. Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu<br>s poruchou abdukce vlevo.....                                     | 1 %   |

#### Traumatické poruchy nervů horní končetiny

|   |      |
|---|------|
| V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické   |      |
| 184. Traumatická porucha nervu axilárního vpravo.....   | 30 % |
| 185. Traumatická porucha nervu axilárního vlevo .....   | 25 % |
| 186. Traumatická porucha kmene nervu vřetenního<br>s postižením všech inervovaných svalů vpravo .....   | 45 % |
| 187. Traumatická porucha kmene nervu vřetenního<br>s postižením všech inervovaných svalů vlevo .....  | 37 % |
| 188. Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce<br>trojhlavého svalu vpravo .....  | 35 % |
| 189. Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce<br>trojhlavého svalu vlevo .....   | 27 % |
| 190. Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo.....   | 30 % |
| 191. Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo .....   | 20 % |
| 192. Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením<br>všech inervovaných svalů vpravo.....   | 40 % |
| 193. Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením<br>všech inervovaných svalů vlevo .....   | 33 % |
| 194. Traumatická porucha distální části loketního nervu<br>se zachováním funkce ulnářního ohýbače karpu<br>a části hlubokého ohýbače prstů vpravo.....  | 30 % |
| 195. Traumatická porucha distální části loketního kloubu<br>se zachováním funkce ulnářního ohýbače karpu<br>a části hlubokého ohýbače prstů vlevo ..... | 25 % |
| 196. Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením<br>všech inervovaných svalů vpravo.....   | 30 % |
| 197. Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením<br>všech inervovaných svalů vlevo .....   | 25 % |
| 198. Traumatická porucha distální části středního nervu postižení<br>hlavně thenarového svalstva vpravo .....   | 15 % |
| 199. Traumatická porucha distální části středního nervu postižení<br>hlavně thenarového svalstva vlevo .....  | 12 % |
| 200. Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě<br>i celé pletené pažní vpravo .....  | 60 % |
| 201. Traumatická porucha všech tří nervů,<br>popřípadě i celé pletené pažní vlevo .....   | 50 % |

#### Úrazy dolních končetin

|   |      |
|---|------|
| 202. Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo<br>v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem .....   | 60 % |
| 203. Pakloub stehenní kosti nebo nekroza hlavičky .....   | 40 % |
| 204. Endoprotéza kyčelního kloubu mimo hodnocení<br>omezení hybnosti kloubu.....  | 15 % |
| 205. Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní<br>jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích<br>nutných k léčení následků úrazu ..... | 25 % |
| 206. Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm.....  | 0 %  |
| 207. Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm.....  | 5 %  |
| 208. Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm.....  | 15 % |
| 209. Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm .....   | 25 % |
| 210. Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchytkou<br>osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchytky<br>(prokázané RTG).....       | 5 %  |
| Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny.  |      |
| 211. Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení<br>od základního postavení nebo nepatrné ohnutí) .....                         | 30 % |
| 212. Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně.....   | 10 % |
| 213. Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně .....  | 20 % |
| 214. Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně.....   | 30 % |

#### Poškození kolena

|   |      |
|---|------|
| 215. Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení<br>(úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším)..... | 30 % |
| 216. Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení<br>(ohnutí v úhlu 30° a větším).....                     | 45 % |
| 217. Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí 15° až 20°) .....                             | 25 % |
| 218. Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu<br>(mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu).....                | 15 % |
| 219. Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně.....  | 10 % |
| 220. Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně .....   | 15 % |
| 221. Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně.....  | 25 % |
| 222. Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti<br>jednoho postranního vazy.....                        | 5 %  |
| 223. Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního<br>nebo zadního zkříženého vazy.....           | 15 % |

|   |      |
|---|------|
| 224. Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazy .....  | 25 % |
| 225. Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem)..... | 5 %  |
| 226. Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem).....       | 10 % |
| 227. Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů .....  | 15 % |

#### Poškození bérce

|   |      |
|---|------|
| 228. Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem.....  | 50 % |
| 229. Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce.....   | 30 % |
| 230. Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu .....       | 22 % |
| 231. Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5° ..... | 5 %  |
| Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.  |      |

#### Poškození v oblasti hlezenného kloubu

|  |      |
|--|------|
| 232. Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním .....   | 40 % |
| 233. Ztráta chodidla v Chopartově kloubu .....   | 30 % |
| 234. Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním.....  | 25 % |
| 235. Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší plantární flexe nad 20°) .....  | 30 % |
| 236. Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení .....   | 20 % |
| 237. Úplná ztuhlost hlezenného kloubu (plantární flexe od 5° do 20°).....  | 25 % |
| 238. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně.....  | 6 %  |
| 239. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně .....   | 12 % |
| 240. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně.....  | 20 % |
| 241. Omezení pronace a supinace nohy.....  | 12 % |
| 242. Úplná ztráta pronace a supinace nohy.....   | 15 % |
| 243. Viklavost hlezenného kloubu.....  | 20 % |
| 244. Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy.....   | 25 % |
| 245. Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu..... | 15 % |

#### Poškození v oblasti nohy

|   |      |
|---|------|
| 246. Ztráta všech prstů nohy.....   | 15 % |
| 247. Ztráta obou článků palce nohy.....   | 10 % |
| 248. Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí .....      | 15 % |
| 249. Ztráta koncového článku palce nohy.....                                      | 3 %  |
| 250. Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst.....                 | 2 %  |
| 251. Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí .....                 | 10 % |
| 252. Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce nohy.....                        | 3 %  |
| 253. Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy .....                            | 7 %  |
| 254. Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy .....                                  | 10 % |
| 255. Omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu palce nohy .....                 | 3 %  |
| 256. Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy .....                      | 7 %  |
| 257. Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst ..... | 1 %  |

|  |      |
|--|------|
| 258. Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině .....                                 | 15 % |
| 259. Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách .....                              | 30 % |
| 260. Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně ..... | 5 %  |
| 261. Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce.....   | 3 %  |

#### Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

|   |      |
|---|------|
| V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické                   |      |
| 262. Traumatická porucha nervu sedacího .....   | 50 % |
| 263. Traumatická porucha nervu stehenního .....   | 30 % |
| 264. Traumatická porucha nervu obturatorního .....  | 20 % |
| 265. Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů..... | 35 % |
| 266. Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů .....   | 5 %  |
| 267. Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů..... | 30 % |
| 268. Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového.....                               | 20 % |
| 269. Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového .....                             | 10 % |

#### Ostatní druhy poranění

|  |            |
|--|------------|
| 270. Jizvy a deformity (kromě bodu 34 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození ..... | se nehradí |
| 271. Poúrazové pigmentační změny .....   | se nehradí |
| 272. Poúrazové bolesti bez funkčního poškození .....   | se nehradí |
| 273. Ztráta vitality zubu .....  | se nehradí |
| 274. Ztráta zubu menší než 50 % .....  | se nehradí |
| 275. Duševní poruchy způsobené úrazem.....   | se nehradí |

Tabulka: Stupeň poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí.

| Vizus | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0    |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6/6   | 0%  | 2%  | 4%   | 6%   | 9%   | 12%  | 15%  | 18%  | 25%  | 28%  | 30%  |
| 6/9   | 2%  | 4%  | 6%   | 9%   | 12%  | 15%  | 18%  | 21%  | 28%  | 31%  | 35%  |
| 6/12  | 4%  | 6%  | 9%   | 12%  | 15%  | 18%  | 21%  | 25%  | 31%  | 35%  | 40%  |
| 6/15  | 6%  | 9%  | 12%  | 15%  | 18%  | 21%  | 25%  | 29%  | 35%  | 40%  | 45%  |
| 6/18  | 9%  | 12% | 15%  | 18%  | 21%  | 25%  | 29%  | 33%  | 39%  | 45%  | 50%  |
| 6/24  | 12% | 15% | 18%  | 21%  | 25%  | 29%  | 33%  | 38%  | 44%  | 50%  | 60%  |
| 6/36  | 15% | 18% | 21%  | 25%  | 29%  | 33%  | 38%  | 43%  | 49%  | 60%  | 70%  |
| 6/60  | 18% | 21% | 25%  | 29%  | 33%  | 38%  | 43%  | 49%  | 55%  | 70%  | 85%  |
| 3/60  | 25% | 28% | 31%  | 35%  | 39%  | 44%  | 49%  | 55%  | 65%  | 85%  | 95%  |
| 1/60  | 28% | 31% | 35%  | 40%  | 45%  | 50%  | 60%  | 70%  | 85%  | 100% | 100% |
| 0     | 30% | 35% | 40%  | 45%  | 50%  | 60%  | 70%  | 85%  | 95%  | 100% | 100% |

Stupeň poškození odpovídá nevrátnému poškození nebo ztrátě zraku. Při úplné ztrátě zraku obou očí nemůže celkový stupeň trvalého tělesného poškození přesáhnout 100%.